SYNTHÈSES W

DE PHARMACIE ET DE CHIMIE

PRÉSENTÉES ET SOUTENUES A L'ÉCOLE DE PHARMACIR.

SIROP D'IPÉCACUANHA COMPOSÉ.

(Sirop de Desessart.)

SYRUPUS CUM IPECACUANHA COMPOSITUS.

2 Ipécacuanha gris (Cephwlis Ipecacuanha), Feuilles de Séné (Cassia acutifolia), Sommités sèches de Serpolet (Thymus serpillum). Fleurs sèches de Coquelicot (Papaver rhæas). Sulfate de Magnésie (Sulfas magnesicus). Vin blanc (Vinum album). Eau de Fleurs d'Oranger (Aqua Naphe). Sucre blanc (Saccharum album).



Faites macérer l'Ipécacuanha et le Séné dans le Vin blanc pendant douze heures; passez avec expression, et filtrez la liqueur. Mettez le résidu dans un bain-marie avec le Coquelicot, le Serpolet et le Sulfate de Magnésie; versez dessus
kilogramme d'eau bouillante; laissez infuser pendant douze heures; passez avec expression, mélangez alors le produit avec la liqueur vineus et l'Eau de Fleurs d'Oranger; ajoutez à ce mélange le double de son poids de Sucre, et faites un sirop par simple solution à chaud au bain-marie.

EXTRAIT DE RÉGLISSE.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

97.	Racinos	chohoc	d٨	P.óglicco	(Glucurrhiza alabra).	1500
4	nacines	seches	ue	negusse	((:lucurrniza alabra).	1000

Coupez la racine de Réglisse en tronçons minces; faites-la sécher à l'étuve, et réduisez-la en poudre demi-fine en la passant au moulin; humetez cette poudre avec la moitié de son poids d'eau distillée froide, et, après douze heures de contact, tassez-la convenablement entre deux diaphragmes dans un cylindre en étain; lessivez-la avec de l'eau distillée à 45 ou 20 degrés; arrêtez l'écoulement des liqueurs aussitôt qu'elles passeront peu concentrées; chauffez-les au bain-marie; passez-les pour séparer le coagulum qui se sera formé, et procédez à l'évaporation au bainmarie jusqu'en consistance d'extrait.

TABLETTES DE BAUME DE TOLU.

TABELLÆ CUM BALSAMO TOLUTANO.

....

62	Baume de Tolu (Balsamum tolutanum).		32
16	Sucre très-blanc (Saccharum albissimum).		500
	Gomme adragante (Gummi tragacantha)		5,3
	Alcool à 34 Cart. (86 cent.) (Alcool)		32
	Eau distillée (Aqua stillatitia)		64

Faites dissoudre le Baume de Tolu dans l'alcool; ajoutez l'eau distillée; chauffez quelques instants au bain-marie et filtrez; servez-vous de la liqueur pour faire un mucilage avec la gomme adragante, et préparez une masse que vous diviserez en tablettes de 8 décigrammes.

POMMADE ÉPISPASTIQUE JAUNE.

POMATUM LUTEUM CUM CANTHARIDIBUS.

24	Cantharides en poudre grossière (Pulvis Cantharidum).							
	Graisse de Porc (Adeps Porcinus).				·.	1680		
	Cire jaune (Cera flava)					250		
	Curcuma en poudre (Pulvis Curcu		8					
	Huile volatile de Citron (Oleum volatile Citreorum)							

Mettez les Cantharides et l'Axonge dans un bain-marie, et faites digérer pendant trois à quatre heures à la température de l'eau bouillante, en agitant de temps en temps; passez avec forte expression; remettez la pommade sur le feu avec la poudre de Curcuma, faites digérer, filtrez; faites liquéfier le produit avec la Cirejaune; remuez le mélange jusqu'à ce qu'il soit en grande partie refroidi, et aromatisez le avec l'huile volatile de Citron.

MIXTURE CATHÉRÉTIQUE.

(Collyre de Lanfranc.)

MIXTURA CATHÆRETICA.

¥	Vin blanc généreux (Vinum album). Eau distillée de Roses (Hydrolatum R — de Plantain (Hydrolatum Plantag	n).	:	1000	380	
	Orpiment (Sulfuretum Arseniosum).				16	
	Verdet gris (Sub-acetas Cupricus).				8	
	Myrrhe (Myrrha).				5	
	Aloès Socotrin (Aloe socotrina)				5	

Mettez dans un mortier de verre toutes les substances solides , préalablement réduites en une poudre très-fine; délayez-les dans le Vin blanc par une longue trituration; ajoutez les eaux distillées et conservez le mélange dans un flacon; vous l'agiterez chaque fois que vous devrez en faire usage.

ACIDE SULFURIQUE ALCOOLISÉ.

(Eau de Rabel.)

ACIDUM SULFURICUM, ALCOOLISATUM

4 Acide sulfurique (Acidum sulfuricum) à 66 degrés. 200 Alcool (Alcool) à 33 degrés Cart. (85 cent.). 600 Mèlez peu à peu, en versant l'Acide sur l'Alcool; laissez déposer, décantez et conservez dans un flaçon pour l'usage.

SULFITE DE CHAUX.

SULFIS CALCICUS.

L'arbonate de Chaux (Craie) (Carbonas calcicus).

Acide sulfurique (Acidum sulfuricum) à 66 degrés.

Charbon végétal pulvérisé (Carbo è ligno).

Délayez le Charbon pulvérisé, avec l'Acide sulfurique, de manière à en faire une pâte presque solide; introduisez cette pâte dans un matras en verre, placé sur un bain de sable; adaptez-y un tube deux fois courbé à angle droit, pour faire arriver le gaz dans un flacon de lavage contenant une petite quantité d'eau; faites partir de ce flacon un deuxième tube semblablement courbé, destiné à

porter le gaz au fond d'un bocal en verre ou d'un pot de grès,

L'appareil ainsi disposé, prenez des pains de Craie, trempez-les pendant quelques instants dans l'eau; réduisez-les en petits fragments de la grosseur du doigt; placez-les dans le vase qui termine suppareil. Chauffez ensuite graduellement le mélange d'Acide et Gehrborn, et souteñs la réaleur j'asjava c'es fille is d'égagement de gaz cesse. Si on s'apercevait, dans le courant de l'opération, que du gaz sulfureux passàt sans être absorbé, on ajouterait une nouvelle quantité de craie humeetée.

Lorsque l'opération sera terminée, séparez le sulfite de la craie non saturée: celle-ci, qui occupe toujours la partie supérieure, se distingue à sa couleur d'un blanc ma tet au peu de cohésion qu'elle conserve. Le sulfite, au contraire, a acquis beaucoup de dureté et une teinte d'un gris jaunâtre. On pulvérise le sulfite, et on le con serve pour l'usage.

SULFURE DE CALCIUM IMPUR.

(Foie de soufre calcaire.)

SULFURETUM CALCICUM.

4	Soufre sublimé (Sulfur sublimatum).							500
		(H	Hydras calcicus).					1500
	Eau (Aqua).							2500

Mélangez bien exactement dans une terrine vernissée; faites bouillir jusqu'à ce qu'une petite portion du mélange, versée sur une surface froide, se prenne en masse solide par le refroidissement; coulez sur un marbre, et, aussitôt que la masse se sera solidifiée, brisez-la en fragments que vous conserverez dans des bocaux soigneusement bouchés.

Le Sulfure de Calcium pur se préparerait en faisant chauffer fortement, dans un creuset couvert et bien luté, un mélange de 400 parties de Gypse statuaire calciné réduit en pudre fine, et 15 parties de Noir de fumée. Ce Sulfure est blanc.

ALCOOL A 40 DEGRÉS.

ALCOOL OUADRAGINTA GRADUS NOTANS.

Versez l'Alcool sur l'Acctate de Potasse, et distillez le mélange au bain-marie, après vingt-quatre heures de contact. Le produit obtenu devra marquer de 40 à 42 degrés à l'aréomètre de Cartier (95 à 97 cent.).

`Il convient, lorsqu'on opère sur des quantités un peu considérables, de fractionner les produits, et de mettre de côté ceux qui n'ont pas le degré voulu.